Φύλλο Οδηγιών χρήσης : Πληροφορίες για τον χρήστη

Maxudin 20mg δισκία
Maxudin 40mg δισκία

Πραβαστατίνη νατριούχος

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για εσάς. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών :

1 Τι είναι το Maxudin και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Maxudin
3 Πώς να πάρετε το Maxudin
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Maxudin
6 Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Maxudin και ποια είναι η χρήση του

Το Maxudin ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται στατίνες που είναι ρυθμιστικά φάρμακα των λιπιδίων.
Το Maxudin χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την παραγωγή της χοληστερόλης από το συκώτι και με αυτόν τον τρόπο μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων, γνωστά ως τριγλυκερίδια, στο σώμα σας, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και αλλαγές στον τρόπο ζωής (π.χ. άσκηση) έχουν αποτύχει. Όταν έχετε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σας, η χοληστερόλη συσσωρεύεται . στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και τα αποφράσσει.
Η πάθηση αυτή ονομάζεται σκλήρυνση των αρτηριών ή αρτηριοσκλήρυνση και μπορεί να οδηγήσει σε :
- Πόνο στο στήθος (στηθάγχη), όταν ένα αιμοφόρο αγγείο στην καρδιά είναι μερικώς αποφραγμένο.
- Καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα του μυοκαρδίου), όταν ένα αιμοφόρο αγγείο στην καρδιά είναι πλήρως αποφραγμένο.
- Εγκεφαλικό επεισόδιο (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), όταν ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο είναι πλήρως αποφραγμένο.

Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται σε 3 περιπτώσεις:
<u>Για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων χοληστερόλης και λιπιδίων στο αίμα</u>
Το Maxudin χρησιμοποιείται για την μείωση υψηλών επιπέδων της "κακής" χοληστερόλης και την αύξηση των επιπέδων της "καλής" χοληστερόλης στο αίμα, όταν αλλαγές στη δίαιτα και άσκηση έχουν αποτύχει να το κάνουν ικανοποιητικά.

<u>Για την πρόληψη νόσων της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων</u>
- Εάν έχετε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σας και παράγοντες κινδύνου που ευνοούν αυτά τα νοσήματα (εάν καπνίζετε, είστε υπέρβαρος, εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή υψηλή αρτηριακή πίεση, εάν γυμνάζεστε λίγο), το Maxudin χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο

κίνδυνος εμφάνισης νόσων στην καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία και να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτου από τις ασθένειες αυτές.
- Εάν ήδη είχατε ένα εγκεφαλικό ή εάν έχετε πόνο στο στήθος (ασταθής στηθάγχη), και ακόμη και αν έχετε φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης, το Maxudin χρησιμοποιείται για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός άλλου καρδιακού επεισοδίου ή εγκεφαλικού στο μέλλον και να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτου από τις ασθένειες αυτές.

Μετά από μεταμοσχεύσεις οργάνων
Εάν υποβληθήκατε σε μεταμόσχευση οργάνου και λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη της απόρριψης του μοσχεύματος, το Maxudin χρησιμοποιείται για να μειώσει τα αυξημένα επίπεδα των λιπιδίων στο αίμα.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Maxudin

Μην πάρετε το Maxudin
- Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην πραβαστατίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- Σε περίπτωση που είστε έγκυος, ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, ή θηλάζετε (βλέπε Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα).
- Σε περίπτωση που πάσχετε από νόσο του ήπατος (ενεργή ηπατική νόσο).
- Σε περίπτωση που ορισμένες εξετάσεις αίματος έχουν δείξει μη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος σας (αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων στο αίμα).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Maxudin:

- Εάν πάσχετε από ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία
- Εάν έχετε υπερχοληστερολαιμία που οφείλεται στην αύξηση της HDL-χοληστερόλης
- Εάν έχετε προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου
- Εάν καταναλώνετε συστηματικά μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος (αλκοόλης)
- αν έχετε προβλήματα με τους νεφρούς σας
- Εάν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμό)
- Εάν είχατε επανειλημμένα ή ανεξήγητα μυϊκά άλγη, ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μυϊκών προβλημάτων
- Εάν είχατε προηγούμενα μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα (για παράδειγμα άλλη '-στατίνη' ή '-φιμπράτη')
- Εάν πάσχετε ή έχετε ιστορικό μυασθένειας (νόσο με γενική μυϊκή αδυναμία, περιλαμβανομένων σε ορισμένες περιπτώσεις μυών που χρησιμοποιούνται κατά την αναπνοή), ή οφθαλμική μυασθένεια (νόσο που προκαλεί μυϊκή αδυναμία των οφθαλμών) καθώς οι στατίνες μπορεί ορισμένες φορές να επιδεινώσουν την κατάσταση ή να οδηγήσουν στην εμφάνιση μυασθένειας (βλ. παράγραφο 4).

Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας κάνει εξέταση αίματος προτού αρχίσετε να λαμβάνετε το Maxudin και εάν έχετε συμπτώματα που οφείλονται σε προβλήματα ήπατος ενώ παίρνετε το Maxudin. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο γιατρός σας να ελέγξει πόσο καλά λειτουργεί το συκώτι σας.
Ο γιατρός σας μπορεί επίσης να θέλει να κάνετε εξετάσεις αίματος για να ελέγξετε πόσο καλά λειτουργεί το συκώτι σας αφού αρχίσετε να παίρνετε το Maxudin.

Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας: αισθανθείτε ανεξήγητο μυϊκό πόνο, ευαισθησία, αδυναμία ή κράμπες.

Παιδιά και έφηβοι

Πριν από την έναρξη της θεραπείας σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, η σχέση όφελους / κινδύνου της θεραπείας πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά από το γιατρό.

Άλλα φάρμακα και Maxudin

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνονται χωρίς ιατρική συνταγή.

Η λήψη του Maxudin με οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μυϊκών προβλημάτων:

- Κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας).
- Νικοτινικό οξύ (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης στο αίμα).
- Ριφαμπικίνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας λοίμωξης που ονομάζεται φυματίωση)
- Λεναλιδομίδη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενός τύπου καρκίνου του αίματος που ονομάζεται πολλαπλό μυέλωμα)
- Φιμπράτες (όπως γεμφιβροζίλη, φαινοφιβράτη)

Συνδυασμοί που απαιτούν προσοχή:

- Χολεστυραμίνη/Κολεστιπόλη
- Κυκλοσπορίνη
- Βαρφαρίνη και άλλα από του στόματος αντιπηκτικά
- Προϊόντα που μεταβολίζονται από το κυτόχρωμα P450 (όπως διλτιαζέμη, βεραπαμίλη, ιτρακοναζόλη, κετοκοναζόλη, αναστολείς της πρωτεάσης, χυμός γκρέϊπ φρουτ, και αναστολείς του CYP2C9, (π.χ. φλουκοναζόλη).
- ερυθρομυκίνη ή κλαριθρομυκίνη.
- ακετυλοσαλικυλικό οξύ, αντιόξινα, νικοτινικό οξύ ή προβουκόλη.

Το Maxudin με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη
Η θεραπεία αυτή μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς φαγητό, με μισό ποτήρι νερό.
Πρέπει πάντα να διατηρείτε τη λήψη αλκοόλης στο ελάχιστο. Εάν σας απασχολεί πόσο αλκοόλ μπορείτε να πιείτε κατά τη διάρκεια της λήψης αυτού του φαρμάκου, αυτό πρέπει να το συζητήσετε με το γιατρό σας.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Το Maxudin δεν επηρεάζει συνήθως την ικανότητα σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές.
Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ζαλάδα, θαμπή ή διπλή όραση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σιγουρευθείτε ότι μπορείτε να οδηγήσετε και να χειριστείτε μηχανές πριν δοκιμάσετε να το κάνετε.

3. Πώς να πάρετε το Maxudin

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι 10-40mg.

Πριν από την έναρξη θεραπείας με το MAXUDIN, οι δευτερογενείς αιτίες υπερχοληστερολαιμίας θα πρέπει να αποκλείονται και οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε κλασική δίαιτα μείωσης λιπιδίων που θα πρέπει να συνεχισθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Υπερχοληστερολαιμία:
Το προτεινόμενο εύρος δόσης είναι 10-40 mg μια φορά την ημέρα. Η θεραπευτική απόκριση παρατηρείται εντός μιας εβδομάδας και η πλήρης δράση ενός δοσολογικού σχήματος παρατηρείται εντός τεσσάρων εβδομάδων, επομένως θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος των λιπιδίων και η δόση να ρυθμίζεται ανάλογα. Η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 40 mg.

Καρδιαγγειακή πρόληψη:
Η μόνη αρχική δόση και δόση συντήρησης που μελετήθηκε είναι αυτή των 40 mg ημερησίως.

Δοσολογία μετά από μεταμόσχευση:
Εάν έχετε κάνει μεταμόσχευση οργάνου και παίρνετε ανοσοκατασταλτική θεραπεία, η αρχική δόση του Maxudin θα πρέπει να είναι 20 mg ημερησίως. Με βάση την απόκριση των τιμών των λιπιδίων, η δόση μπορεί να ρυθμισθεί μέχρι και τα 40 mg κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ηλικιωμένοι ασθενείς:
Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται ρύθμιση της δόσης στους ασθενείς αυτούς εκτός εάν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία:
Αν έχετε μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η αρχική σας δόση θα πρέπει να είναι 10 mg. Η δόση θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την απόκριση των τιμών των λιπιδίων και κάτω από ιατρική παρακολούθηση.

Συνυπάρχουσα θεραπεία:
Η δράση του MAXUDIN για τη μείωση των λιπιδίων στην ολική χοληστερόλη και στην LDL-χοληστερόλη ενισχύεται όταν συνδυάζεται με μια ρητίνη που δεσμεύει χολικά οξέα (π.χ. χολεστυραμίνη, κολεστιπόλη). Το MAXUDIN πρέπει να χορηγείται πριν ή τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά τη ρητίνη.
Εάν λαμβάνετε κυκλοσπορίνη με ή χωρίς άλλα ανοσοκατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα, η θεραπεία πρέπει να ξεκινά με 20 mg πραβαστατίνης ημερησίως και η ρύθμιση στα 40 mg να γίνεται με προσοχή.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Παιδιά και έφηβοι (8-18 χρονών) με ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία:**:** το συνιστώμενο εύρος δόσης είναι 10-20 mg μια φορά την ημέρα μεταξύ 8 και 13 χρονών καθώς δόσεις μεγαλύτερες των 20 mg δεν έχουν μελετηθεί στον πληθυσμό αυτό και 10-40 mg την ημέρα μεταξύ 14 και 18 χρονών.

Τρόπος χορήγησης

Το MAXUDIN χορηγείται από το στόμα μια φορά την ημέρα κατά προτίμηση το βράδυ με ή χωρίς τροφή.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Maxudin από την κανονική
Εάν πάρετε υπερβολική δόση του φαρμάκου, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αμέσως ή πηγαίνετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του κοντινότερου νοσοκομείου. Θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας το κουτί του φαρμάκου ή το φύλλο οδηγιών.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Maxudin
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο ή τη δόση που ξεχάσατε. Πάρτε την επόμενη κανονική δόση όπως είναι προγραμματισμένο (σύμφωνα με τη παράγραφο 3 «Πως να πάρετε το Maxudin»).

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος:
Όχι συχνές: ζάλη, πονοκέφαλος, διαταραχή ύπνου, αϋπνία
Μη γνωστές: Μυασθένεια gravis (νόσος που προκαλεί γενική μυϊκή αδυναμία, περιλαμβανομένων σε ορισμένες περιπτώσεις μυών που χρησιμοποιούνται κατά την αναπνοή).

Οφθαλμικές διαταραχές:
Όχι συχνές: διαταραχή της όρασης (συμπεριλαμβανομένων θαμπή όραση και διπλωπία)
Μη γνωστές: Οφθαλμική μυασθένεια (νόσος που προκαλεί μυϊκή αδυναμία των οφθαλμών).
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε αδυναμία στα χέρια ή τα πόδια σας η οποία επιδεινώνεται μετά από περιόδους δραστηριότητας, διπλή όραση ή ατονία των βλεφάρων σας, δυσκολία στην κατάποση ή δυσκολία στην αναπνοή.

Γαστρεντερικές διαταραχές:
Όχι συχνές: δυσπεψία/αίσθημα καύσου, πόνος στο στομάχι, ναυτία/έμετος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, φούσκωμα

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
Όχι συχνές: κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση, ανωμαλία του τριχωτού της κεφαλής/τριχοφυΐας (συμπεριλαμβανομένης της αλωπεκίας)
Μη γνωστές: εξάνθημα συμπεριλαμβανομένου του λειχηνοειδούς εξανθήματος

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:
Μη γνωστές: ηπατική ανεπάρκεια θανατηφόρα και μη θανατηφόρα

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών:
Όχι συχνές: διαταραχές ούρησης (συμπεριλαμβανομένων δυσουρίας, συχνουρίας, νυκτουρίας)

Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού:
Όχι συχνές: σεξουαλική δυσλειτουργία

Γενικές διαταραχές
Όχι συχνές: κόπωση

Μετά την κυκλοφορία
Επιπλέον των παραπάνω, οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μετά την κυκλοφορία της πραβαστατίνης:

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Πολύ σπάνιες: περιφερική πολυνευροπάθεια, ιδιαιτέρως εάν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παραισθησία

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες: αντιδράσεις υπερευαισθησίας: αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, σύνδρομο προσομοιάζον προς ερυθηματώδη λύκο

Γαστρεντερικές διαταραχές:
Πολύ σπάνιες: παγκρεατίτιδα

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:
Πολύ σπάνιες: ίκτερος, ηπατίτιδα, κεραυνοβόλος ηπατική νέκρωση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Πολύ σπάνιες: ραβδομυόλυση, που μπορεί να σχετισθεί με οξεία νεφρική ανεπάρκεια δευτερογενώς λόγω μυοσφαιρινουρίας, μυοπάθεια .
Μεμονωμένες περιπτώσεις διαταραχών τένοντα, μερικές φορές με επιπλοκή ρήξης.
Μη γνωστές: Ρήξη μυός

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040337
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
http://www.kitrinikarta.gr

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Maxudin

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία άνω των 30°C. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην εξωτερική συσκευασία μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Maxudin

- Η δραστική ουσία είναι η νατριούχος πραβαστατίνη.
- Κάθε δισκίο περιέχει 20 ή 40mg νατριούχο πραβαστατίνη.
- Τα άλλα συστατικά είναι πολυβιδόνη, λακτόζη άνυδρη, οξείδιο του μαγνησίου, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, οξείδιο του σιδήρου, διασταυρούμενη νατριούχος καρμελλόζη, μαγνήσιο στεατικό.

Εμφάνιση του Maxudin και το περιεχόμενο της συσκευασίας

Maxudin tabs 20mg: Κουτί που περιέχει PVC blister με 10 κίτρινα δισκία (ΒΤ x 10), {blister 1 x 10}
Κουτί που περιέχει PVC blister με 14 κίτρινα δισκία (ΒΤ x 14),{blister 1 x 14}

Maxudin tabs 40mg: Κουτί που περιέχει PVC blister με 14 κίτρινα δισκία (ΒΤ x 14), blister 1 x 14}

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite SRL, Firenze – Italy

Τοπικός αντιπρόσωπος :
Menarini Hellas AE,
Πάτμου 16-18
151 23 Μαρούσι
Αττική
Τηλ. 210 8316111-13
Email: info@menarini.gr

Παρασκευαστής
A. MENARINI Manufact. Logistics & Services SRL, L'Aquila, ITA

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 10/2026